

鼻炎用内服薬

コルゲン^{ユー}鼻炎ジェルカプセル α

- 中味が液状で、効きめの成分がいち早く溶け出します。
- 『鼻みず』などにすぐれた効果をあらわすd-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ベラドンナ総アルカロイドを一般用医薬品の鼻炎用内服薬製造販売承認基準[※]の最大量配合しています。
※承認基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと
- 食後に限らず、症状があるときにいつでも*服用できます。
*服用間隔は4時間以上あけること

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
- ②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ③長期連用しないでください

🗨 相談すること

- ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)高齢者。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。


- ③服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- ④5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。
ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル 	3回
15歳未満の小児	✕服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を厳守してください。
- ②カプセルの取り出し方：

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 (1カプセル中)

成分・分量	動き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.0mg	アレルギーなどによる鼻みず・くしゃみを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド 0.2mg	鼻汁と涙液の分泌を抑制し、鼻みず・なみだ目を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 15.0mg	鼻粘膜の充血やハレを抑え、鼻づまりを改善します。
フェニレフリン塩酸塩 5.0mg	
無水カフェイン 40.0mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

[添加物]ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、酸化チタン、大豆レシチン

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意してください。
- ⑤使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

